

Indikator (● = ny indikator 2007)	Riksnitt	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar	Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	Västra Götaland	Värmland	Örebro	Västermanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrboten	
A • Medicinska resultat																							
Allmänna indikatorer inklusive vaccinationer, screening																							
1a	Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Hälsopolitisk indikator. Kvinnor	27,2	31,4	24,8	29,9	23,3	20,9	21,9	24,3	38,2	23,0	29,9	22,8	24,6	27,0	32,7	31,3	25,9	31,2	25,1	23,6	22,3	24,5
1b	Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Hälsopolitisk indikator. Män	46,0	51,6	42,1	47,7	39,5	40,2	41,1	44,0	57,3	46,7	51,7	43,3	43,8	43,6	47,5	47,5	45,2	49,1	48,3	40,0	36,8	36,4
2a	Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Sjukvårdspolitisk indikator. Kvinnor	25,7	24,1	23,6	30,0	23,8	23,4	26,1	29,2	32,0	23,2	24,4	19,8	25,2	28,5	26,8	30,0	24,6	34,8	28,6	27,5	24,2	30,4
2b	Åtgärdbar dödlighet 2001-2004 per 100 000 inv. Sjukvårdspolitisk indikator. Män	36,8	36,4	26,9	42,5	36,0	40,2	26,9	37,7	49,8	32,2	33,3	28,2	37,1	46,6	41,2	31,1	38,7	41,7	34,7	42,3	37,4	46,1
3a	Antal pers. med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 inv. 2004-2006. Kvinnor	882	838	874	871	816	854	852	863	974	823	887	900	910	908	883	928	940	873	987	829	986	944
3b	Antal pers. med undvikbara slutenvårdstillfällen per 100 000 inv. 2004-2006. Män	1111	1079	1093	1050	1029	1056	1059	1071	1209	1042	1137	1055	1135	1163	1121	1115	1189	1086	1252	1061	1226	1201
4	Andel MPR-vaccinerade barn, barn födda 2004.	96,2	94,5	93,1	97,8	97,5	97,9	96,4	98,2	95,4	97,3	95,8	97,4	96,7	97,7	97,9	97,2	97,6	97,0	98,1	97,3	96,7	96,1
5	Influensavaccinering av äldre, säsongen 2006/2007.	56,3	64,0		55,0	55,0	66,0	66,0	55,0		53,0	55,5	60,0	50,0	63,0		49,0	50,0	44,3	55,0	55,0	66,0	47,0
6	MRSA-fall per 100 000 inv. 2005-2006, inhemska fall.	6,8	11,2	3,1	1,5	13,2	9,2	4,5	4,9	10,4	2,3	7,7	4,7	5,2	2,9	5,8	12,1	2,2	4,3	1,8	2,4	2,3	1,8
Läkemedelsanvändning																							
7	Andelen äldre med 10 eller fler läkemedel, oktober-december 2006.	16,4	14,2	20,4	14,1	15,0	15,1	18,5	13,6	11,5	12,3	17,1	17,3	19,8	17,6	14,5	15,1	14,2	15,3	16,7	14,9	19,6	15,7
8	Andelen äldre med tre eller flera psykofarmaka, oktober-december 2006.	6,43	5,18	7,40	6,10	5,37	6,50	7,61	4,63	3,87	6,28	7,23	7,33	8,16	7,27	5,94	5,62	5,28	5,91	6,05	5,33	6,61	4,68
9	Andelen äldre med läkemedel med risk för D-interaktioner, oktober-december 2006	4,41	3,98	4,98	4,19	4,06	3,96	4,50	3,85	4,43	4,06	4,08	4,19	5,44	5,04	4,25	4,22	4,27	4,13	4,44	3,48	4,83	4,62
10	Andel kvinnor behandlade med kinoloner vid urinvägsinfektion, 2006.	24,6	28,0	22,2	19,4	23,5	18,8	30,5	18,4	19,9	26,8	23,1	26,5	26,8	21,0	22,2	22,6	21,1	24,4	24,1	22,0	21,2	20,5
Cancersjukvård																							
11	5-årsöverlevnad i bröstcancer, 1999-2005.	86,8	88,1	88,2	88,9	86,7	86,4	87,1	88,0	83,8	86,6	84,4	88,0	86,6	87,0	83,8	87,3	86,5	86,9	88,4	87,6	85,9	87,5
12a	5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer, 1999-2005. Kvinnor	60,2	59,4	54,9	67,1	52,6	68,5	65,6	59,9	50,2	59,2	60,9	61,8	62,8	63,2	59,4	58,1	63,4	57,3	60,7	56,5	49,5	56,5
12b	5-årsöverlevnad i tjocktarmscancer, 1999-2005. Män	56,2	57,6	56,5	43,1	54,2	54,1	62,0	54,4	48,0	56,7	55,5	62,0	56,9	54,0	54,6	62,1	65,6	57,5	53,6	56,8	45,7	57,3
13a	5-årsöverlevnad i ändtarmscancer, 1999-2005. Kvinnor	60,8	60,7	67,0	48,5	60,4	66,6	71,2	60,6	48,2	75,7	57,0	48,2	60,2	66,9	63,3	65,5	67,5	70,2	63,4	52,0	49,1	66,2
13b	5-årsöverlevnad i ändtarmscancer, 1999-2005. Män	56,3	59,8	59,6	60,8	48,7	54,0	54,4	51,8	57,4	62,6	56,2	61,1	52,3	55,6	56,9	57,0	60,5	51,4	54,8	56,5	57,0	62,6
14	Ändtarmscancer - andel reoperationer inom 30 dagar, 2001-2005.	10,2	8,3	8,3	6,9	5,5	14,6	12,1	10,1	0,0	12,4	10,1	9,8	12,7	12,1	14,9	5,4	10,2	14,2	7,1	5,3	11,7	11,9
15	Prostatacancer - andel som fått kurativt syftande behandling, 2005.	69,9	59,1	66,7	69,4	62,5	84,9	78,1	82,0	50,0	82,6	78,4	60,2	70,4	75,7	76,0	74,7	79,4	74,1	75,3	56,4	71,3	69,1
Förlossningsvård, mödrahälsovård																							
16	Andel aborter före 9:e graviditetsveckan, samt varav farmakologiska, 2004-2006.	72,5	68,1	70,9	78,7	75,9	80,5	77,5	78,6	77,5	66,0	73,6	73,5	72,4	74,0	77,4	74,6	69,5	71,2	70,0	65,6	80,1	79,4
17	Antal dödfödda per 1000 födda barn, 2001-2005.	3,29	2,83	2,47	3,47	3,70	3,65	4,36	3,71	4,27	3,00	3,52	2,43	3,40	3,22	4,09	3,93	3,68	3,12	3,26	2,44	3,68	3,51
18	Antal döda inom 28-dygn per 1000 levande födda, 2001-2005.	2,08	1,86	2,35	2,04	2,03	3,02	2,01	2,49	4,03	3,59	1,80	1,50	2,17	1,82	2,09	2,55	2,92	1,67	2,29	1,14	1,62	2,44
19	Andel födda med låg Apgar-poäng vid 5 minuter, 2001-2005.	1,13	0,97	0,87	1,06	1,39	1,16	1,14	1,50	1,25	1,36	1,18	0,67	1,26	1,05	1,04	1,63	1,13	1,28	1,06	0,99	1,23	1,15
20	Andel bristningar av graden III och IV vid vaginal förlossning, 2001-2005.	4,02	5,05	2,79	3,47	5,02	3,36	3,89	3,85	3,36	5,39	4,13	3,40	3,45	3,06	3,44	2,58	3,91	3,01	4,63	3,71	4,08	3,19
Diabetesvård																							
21	Andel diabetiker som når mål för HbA1c, 2006.	55,0	53,7	54,0	61,4	60,8	58,0	55,3	51,8	38,0	59,7	50,4	59,2	58,8	50,6	51,0	55,3	44,4	56,4	49,6	53,7	57,6	43,7
22	Andel diabetiker som når mål för blodtryck, 2006.	32,8	33,6	29,5	32,2	36,0	31,1	29,3	34,1	30,8	23,8	34,4	36,8	33,5	36,3	32,0	36,7	26,2	33,5	31,1	28,7	33,8	31,2
23	Andel diabetiker med blodtryckssänkande läkemedelsbehandling, 2006.	73,0	72,2	73,1	72,4	74,2	72,3	73,9	70,1	75,1	71,9	72,6	71,9	71,9	74,7	73,1	73,0	72,6	74,7	76,9	75,2	77,7	76,3
24	Andel diabetiker med blodfettssänkande läkemedelsbehandling, 2006.	49,9	51,0	45,6	50,4	53,6	50,3	55,3	48,9	39,7	46,6	53,3	45,8	45,7	51,5	50,6	55,6	51,4	49,5	49,7	48,5	54,2	48,7
Strokesjukvård																							
25a	Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2002-2004. Kvinnor	23,4	21,9	19,0	20,6	25,6	23,8	25,0	25,2	19,4	23,4	24,3	22,6	23,2	27,8	23,7	20,6	22,1	28,9	20,6	23,3	22,7	24,4
25b	Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2002-2004. Män	22,8	22,2	18,1	22,6	23,7	24,1	24,1	26,6	27,7	26,2	21,5	20,0	23,0	25,2	22,2	19,7	23,3	26,0	20,6	24,2	20,9	23,9
26a	Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2004-2006. Sjukhusvårdade pat. Kvinnor	14,7	14,2	13,6	15,2	15,8	14,8	18,7	16,4	14,4	14,9	14,1	14,7	13,5	19,4	17,2	11,7	13,3	17,6	12,8	17,3	13,9	17,2
26b	Dödlighet inom 28 dagar efter stroke, 2004-2006. Sjukhusvårdade pat. Män	14,8	15,3	10,0	16,2	15,0	14,6	14,8	20,0	15,3	16,5	13,0	13,5	13,7	17,0	16,5	14,1	15,1	18,4	12,8	16,7	12,8	16,5
27a	Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2006. Kvinnor	80,2	71,6	79,2	81,1	90,9	79,4	85,2	80,9	96,2	83,3	79,5	84,8	81,6	76,9	87,9	78,0	69,6	77,1	90,7	68,9	88,4	92,2
27b	Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet, 2006. Män	83,0	76,5	81,6	81,6	89,6	79,4	89,7	85,9	100,0	86,9	82,0	87,9	84,7	81,8	90,2	77,8	73,0	78,0	93,1	79,5	90,4	91,5
28	Andel strokepatienter som var ADL-beroende 3 månader efter akutfasen, 2006.	20,5	18,4	22,2	20,1	17,3	26,0	28,4	25,9	27,1	27,5	18,6	22,0	21,2	19,2	20,6	17,1	21,0	20,9	17,5	23,7	18,9	23,3
29a	Andel strokepat. med hjärtflimmer med blodförtunnande behandl., jan.-jun. 2007. Kvinnor	40,8	32,4	37,7	48,3	56,9	41,6	60,7	51,8	57,1	46,9	40,9	47,3	34,4	37,1	42,1	48,2	47,4	53,2	42,9	41,7	51,7	46,5
29b	Andel strokepat. med hjärtflimmer med blodförtunnande behandl., jan.-jun. 2007. Män	50,2	44,4	47,4	65,5	63,2	47,9	48,8	47,4	76,9	63,3	57,9	54,9	43,1	62,7	48,8	53,2	51,8	63,8	42,6	50,0	48,8	58,1
30	Återinskrivningar för strokesjukvård inom 365 dagar efter stroke, 2001-2005.	9,7	10,2	9,1	8,9	7,4	11,6	11,3	7,9	10,1	9,1	9,1	9,8	9,9	7,8	9,6	9,3	9,4	8,9	11,6	11,2	10,9	11,3
Hjärtsjukvård																							
31a	Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2002-2004. Kvinnor	30,3	31,3	25,6	33,0	30,7	29,4	26,1	33,3	29,9	30,4	29,7	29,5	30,6	32,2	35,5	27,7	31,8	29,2	26,7	30,6	28,7	28,3
31b	Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2002-2004. Män	33,0	35,4	26,4	32,3	33,8	33,2	29,2	34,6	34,6	35,4	32,4	29,3	32,6	34,6	37,2	31,0	33,7	31,9	30,6	34,6	31,2	34,1
32a	Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2004-2006, sjukhusvårdade pat. Kvinnor	15,1	14,1	14,1	13,2	17,0	14,7	15,3	16,9	12,0	13,2	14,7	15,6	15,4	16,6	18,7	14,6	14,0	15,1	17,4	15,6	13,5	13,7
32b	Dödlighet inom 28 dagar efter hjärtinfarkt, 2004-2006, sjukhusvårdade pat. Män	16,1	16,4	13,8	15,7	16,4	15,3	13,9	17,5	17,3	13,9	16,3	16,1	16,0	18,0	19,9	14,1	14,4	16,7	15,0	17,3	14,6	17,3
33a	Andel reperfusionbehandl. patienter vid ST-höjningsinfarkt, 2006. Kvinnor	70,7	75,6	81,6	60,9	83,5	58,2	75,8	87,5	66,7	70,8	75,4	61,2	71,8	66,7	72,1	73,2</						

Indikator (• = ny indikator 2007)	Riksnitt	Stockholm	Uppsala	Sörmland	Östergötland	Jönköping	Kronoberg	Kalmar	Gotland	Blekinge	Skåne	Halland	Västra Götaland	Värmland	Örebro	Västmanland	Dalarna	Gävleborg	Västernorrland	Jämtland	Västerbotten	Norrbottnen
35a Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, 2006. Kvinnor	75,7	73,9	92,2	91,3	66,9	85,9	80,7	74,5	73,7	66,7	79,9	69,5	70,6	74,2	74,4	78,7	63,3	89,1	62,8	72,7	77,1	73,1
35b Andel clopidogrelbehandlade patienter vid icke ST-höjningsinfarkt, 2006. Män	84,1	84,3	94,0	92,2	81,3	85,8	92,6	79,2	91,4	74,0	86,0	83,7	80,1	81,9	86,5	91,7	71,2	85,6	91,7	84,0	83,0	86,8
36a Hjärtkirurgi - medianväntetid till operation, 2006. Kvinnor	29,0	40,0	27,0	41,0	42,0	65,0	15,0	36,0	34,0	11,0	28,0	31,0	20,0	24,0	22,0	37,0	43,0	25,0	46,0	69,0	38,0	59,0
36b Hjärtkirurgi - medianväntetid till operation, 2006. Män	22,0	28,0	25,0	35,0	15,0	21,0	14,0	30,0	34,0	10,0	18,0	21,0	16,0	17,0	18,0	22,0	32,0	29,0	33,0	52,0	48,0	44,0
37a Andel pat. med blodfettssänk. behandl. efter hjärtinfarkt, jan.-jun. 2007. Kvinnor	80,7	77,8	72,7	83,3	84,3	80,9	79,6	85,2	66,0	80,5	84,9	85,7	77,7	80,1	84,7	90,1	78,2	83,6	77,1	77,0	74,9	81,8
37b Andel pat. med blodfettssänk. behandl. efter hjärtinfarkt, jan.-jun. 2007. Män	85,3	82,8	79,6	86,0	87,1	85,6	90,5	89,7	72,4	89,3	87,8	86,2	83,8	82,3	87,4	93,2	87,1	87,5	84,8	78,1	83,2	84,7
Ortopedisk sjukvård																						
38 Knäledsplastik - revisioner inom 1 år p.g.a. infektion, 1996-2005.	2,91	3,39	3,65	0,71	1,78	0,48	5,78	3,54	0,00	1,76	2,94	2,60	2,22	3,44	1,78	1,71	4,33	4,25	4,22	1,64	3,56	4,31
39 Knäledsplastik - risk för revision inom 5 år, 1996-2005.	3,07	3,27	3,99	1,43	1,86	2,34	2,90	2,82	3,48	2,41	3,47	2,24	2,82	2,69	2,41	1,48	4,18	5,34	3,16	3,90	2,61	3,75
40 Total höftledsplastik - andel implantat som överlever 10 år, 1992-2006.	93,0	91,6	88,2	96,7	94,7	94,1	95,1	95,6	85,8	92,0	90,9	92,6	93,4	91,9	95,2	94,3	92,7	93,4	94,5	94,5	96,4	94,1
41 Total höftledsplastik - omoperation inom 2 år, alla orsaker, 2003-2006.	1,52	1,73	2,20	1,15	1,06	1,78	0,56	1,63	3,37	1,42	1,44	2,01	1,26	1,85	1,03	0,52	0,87	2,48	2,28	1,06	0,53	1,99
42 Total höftledsplastik - patientskattat resultat av operation, 2003-2006.	0,36	0,37		0,41		0,37	0,38			0,44	0,37	0,35	0,34		0,36	0,41			0,37	0,41	0,40	0,40
43 Höftfraktur - andel pat. som skrivs ut till ursprungligt boende efter sjukhusvistelse, 2006.	52,0	38,0		51,0	61,0	42,0	49,0	49,0	46,0	52,0	50,0	47,0	57,0	57,0	52,0		46,0	66,0	52,0	50,0	68,0	
44 Höftfraktur - medelväntetid till operation, dygn, 2006.	1,20	1,60		0,80	1,00	0,90	0,80	0,80	0,80	0,90	1,30	1,10	1,30	1,20	1,40		1,10	0,80	1,20	1,80	1,10	
Annan behandling																						
45 Ljumskräck - relativ risk för omoperation, 1992-2006.		1,11	0,95	1,38	0,99	0,77	1,10	1,17	0,76	0,46	1,02	1,86	1,32	0,79	0,58	0,59	0,73	1,51	0,24	0,82	0,86	0,91
46a Katarakter - andel med synskärpa under 0,5 på bästa ögat, 2006. Kvinnor	24,4	20,5	25,1	25,8	33,8	22,0	17,5	25,9	21,6	16,0	27,9	25,3	23,3	25,4	30,0	18,5	24,0	28,8	29,0	34,1	21,1	23,9
46b Katarakter - andel med synskärpa under 0,5 på bästa ögat, 2006. Män	22,2	17,3	23,0	22,0	31,0	22,4	21,9	26,1	21,8	18,5	25,0	20,7	21,6	22,3	28,4	14,9	23,9	25,1	26,3	29,0	22,3	21,9
47 Antal självmord eller -försök per 100 000 inv. efter psyk. slutenvård, 2002-2006.	13,7	14,4	15,9	14,2	11,7	19,2	15,1	14,7	7,7	8,2	12,6	14,3	14,7	11,9	15,1	15,8	13,1	12,3	11,1	10,7	10,8	13,4
48 Åtstörningsvård - andel förbättrade ett år efter behandlingsstart, 2003-2006.	31,4	43,1	27,9	35,6	34,7	0,0	35,9				27,9	15,4	29,8	55,6	19,5	70,0	60,6	75,0	35,3	32,7	40,0	20,6
B • Patienterfarenheter																						
1 Andel i befolkningen som anser sig ha tillgång till den vård man behöver, 2006.	73,9	75,3	73,2	71,8	71,8	81,1	77,4	81,6		77,8	71,2	82,5	70,5	69,4	76,4	72,3	72,1	68,8	73,3	73,1	78,2	76,9
2 Andel i befolkningen som har förtroende för vården vid vårdcentraler (motsv.), 2006.	53,0	50,7	53,7	51,7	52,2	60,0	53,5	62,5		56,0	50,9	63,5	51,2	51,0	50,6	56,5	51,6	53,0	53,2	54,7	55,7	55,4
3 Andel i befolkningen som har förtroende för vården vid sjukhus, 2006.	66,5	63,5	71,3	61,5	65,1	72,3	73,1	71,7		71,7	66,8	67,5	66,0	62,7	74,1	64,7	68,2	56,2	66,0	69,4	72,4	67,9
4 Sammanfattande betyg på besök vid vårdcentral (motsv.), 2006.	78,0	77,1	76,2	76,3	78,4	79,6	77,5	85,1		83,5	79,4	83,3	76,9	73,0	80,9	78,9	74,0	75,9	75,2	79,1	79,9	77,8
5 Sammanfattande betyg på besök vid mottagning/klinik vid sjukhus, 2006.	83,8	83,3	84,2	81,2	78,3	83,5	84,2	85,7		86,1	82,5	87,7	83,6	83,0	87,5	82,4	92,1	84,8	80,9	84,7	85,5	85,4
6 Andel som anser att man fick den hjälp man förväntat sig - alla besök, 2006.	82,4	82,3	84,5	81,3	79,9	82,5	82,0	86,0		88,3	81,7	85,8	81,9	81,0	84,4	82,1	82,1	80,6	81,1	83,3	84,5	82,7
7 Andel som anser att väntetiden var rimlig vid besök på vårdcentral (motsv.), 2006.	77,8	76,5	77,2	75,3	72,3	80,9	75,7	87,0		81,9	75,9	85,0	77,0	85,6	74,8	80,5	73,1	79,6	74,5	72,4	80,1	79,8
8 Andel som anser att det var lätt att komma fram till vårdcentral (motsv.) per telefon, 2006.	62,7	65,7	52,9	68,1	62,5	55,9	63,5	74,3		65,7	54,0	73,3	64,3	49,7	68,3	58,6	64,8	67,9	53,2	45,7	64,7	75,8
9a Andel strokepat. som var nöjda el. mycket nöjda med vården vid sjukhuset, 2006. Kvinnor	90,7	90,8	83,8	83,0	95,4	91,8	92,5	95,2	100,0	97,8	89,7	85,1	89,7	91,3	95,6	90,4	92,6	87,7	93,0	88,0	95,7	94,3
9b Andel strokepat. som var nöjda el. mycket nöjda med vården vid sjukhuset, 2006. Män	92,7	94,2	88,7	88,5	93,3	93,4	94,0	93,5	93,8	96,6	92,2	83,6	92,4	93,1	97,4	92,7	95,9	91,4	94,1	96,8	92,3	95,2
10a Andel strokepatienter som är nöjda med rehabiliteringen, 2006. Kvinnor	73,3	64,5	62,3	71,8	73,7	77,6	75,9	69,6	67,9	89,9	78,6	67,7	76,4	70,8	78,4	68,1	75,9	69,4	73,5	62,9	80,4	79,6
10b Andel strokepatienter som är nöjda med rehabiliteringen, 2006. Män	76,0	70,4	68,6	71,6	70,9	80,9	82,5	73,7	73,7	91,8	78,9	68,0	80,5	69,0	76,1	75,7	80,8	72,1	77,1	72,3	76,7	80,0
C • Tillgänglighet																						
Primärvård																						
1 Andel patienter som fick läkarbesök i primärvården inom 7 dagar, mars 2007.	88,0	89,0	78,0	84,0	87,0	92,0	90,0	90,0	88,0	91,0	85,0	97,0	91,0	85,0	82,0	85,0	80,0	88,0	83,0	86,0	82,0	90,0
2 Andel patienter som fick läkarbesök i primärvården samma dag, mars 2007.	66,0	66,0	57,0	67,0	63,0	64,0	72,0	62,0	56,0	65,0	68,0	77,0	72,0	65,0	60,0	56,0	55,0	66,0	60,0	65,0	55,0	69,0
Specialiserad vård																						
3 Antal pat. som väntat längre än 90 dagar per 1000 inv. - mottagning, 30 april 2007.	7,0		7,7		7,2	3,7	6,1	2,9	3,0				8,6	4,2	5,8	3,1	12,1	9,9			10,9	12,2
4 Antal pat. som väntat längre än 90 dagar per 1000 inv. - behandling, 30 april 2007.	2,5			2,8	3,1	1,5		1,1	0,4				1,4	2,7	6,5	2,1	1,3		5,7			2,8
D • Kostnader																						
Kostnad per invånare																						
1 Hälsa- och sjukvårdskostnad per invånare, exkl. hemsjukv. och tandvård, 2006, kr.	18 210	19 014	17 276	17 420	16 307	17 502	17 700	18 056	20 786	19 053	18 173	16 807	17 505	18 447	18 512	18 078	18 408	18 683	19 619	18 915	18 828	20 104
2 Faktisk hälso- och sjukvårdskostnad per inv. 2006 i relation till förväntad kostnad.	100,0	110,0	98,9	94,5	91,2	97,5	98,3	97,5	114,7	108,3	95,9	90,8	92,7	99,9	101,4	101,6	102,7	103,7	102,7	102,5	103,8	102,8
3 Kostnader för primärvård per invånare, 2006, kr.	2 939	2 999	2 654	2 891	3 050	2 984	2 641	3024	2 880	2 660	2 529	3 099	2 821	2 940	2 891	2 679	3 001	3 650	3 233	3 928	2 922	4 109
4 Kostnader för specialiserad somatisk vård per invånare, 2006, kr.	9 837	10 189	9 620	10 033	8 603	9 311	9 543	9 578	12 008	10 461	10 470	9 157	9 131	9 642	9 907	9 726	9 949	9 671	11 289	9 469	10 198	10 382
5 Kostnader för specialiserad psykiatrisk vård per invånare, 2006, kr.	1 758	2 230	1 719	1 548	1 285	1 623	1 897	1 536	1 972	1 942	1 657	1 238	1 805	1 415	1 879	1 694	1 618	1 510	1 420	1 457	1 656	1 453
6 Hälsa- och sjukvårdskostnad per inv. Förändring 2004-2006 i löpande priser.	7,3	5,8	6,3	6,1	10,3	10,0	7,8	7,9	11,8	8,1	8,5	7,8	6,0	6,5	6,9	12,9	7,1	6,6	5,8	7,3	10,4	7,1
Kostnad per prestation																						
7 Kostnad per (konsumerad) DRG-poäng. Spec. somatisk vård, 2006, kr.	41 924	42 746	38 815	48 425	40 028	38 881	42 345	36 414	47 978	45 460	41 984	38 884	41 396	43 852	46 725	40 035	43 474	42 848	46 304	42 072	44 859	44 541
8 Årlig förändring av kostnad per DRG-poäng 2004-2006 i fasta priser.	-1,5	-1,6	-4,0	-0,3	0,4	-1,6	0,6	-3,1	1,0	-1,2	0,0	-1,7	-4,0	-0,6	1,2	-2,6	-1,2	-1,4	-3,3	-0,2	0,8	-4,5
9 Kostnad per viktad vårdkontakt i primärvård, 2006, kr.	1 220	1 184	1 591	1 524	1 447	1 330	1 239	1 266	1 073	1 114	1 042	1 175	1 187	1 284	1 297	1 086	1 118	1 351	1 104	1 609	1 330	1 373
Kostnadseffektiva behandlingar																						
10 Andel omeprazolbehandling vid magsår, 2006.	69,0	67,7	68,9	72,6	77,0	73,3	83,9	78,6	79,6	74,5	69,1	71,5	66,9	54,8	49,7	62,7	69,5	70,9	73,6	70,6	70,9	73,0
11 Andel val av lågkostnadsstatiner vid blodfettssänkande behandling, 2006.	80,9	77,9	81,7	88,6	83,7	84,8	82,2	85,3	79,6	83,4	81,9	82,2	78,0	83,0	87,3	80,9	79,8	83,6	76,6	75,8	75,4	80,3
12 Andel framfallsoperationer utförda i dagkirurgi, 2006.	10,0	1,4	2,0	10,1	44,6	11,5	5,2	0,0	0,0	0,0	12,3	1,5										